

# Pacientes con catéteres



## CONSEJO 1

Los catéteres tienen un mayor riesgo de infección. Consulte con su médico sobre la posibilidad de obtener una fístula o injerto en vez de un catéter.



## CONSEJO 2

Aprenda cómo cuidar de su catéter en casa. No permita que el catéter se moje.



## CONSEJO 3

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.

# 6 CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis



## CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben tomar cuando utilizan el catéter para el tratamiento.



## CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de una infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.



## CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con el catéter.

U.S. Department of  
Health and Human Services  
Centers for Disease  
Control and Prevention



# Pacientes con fístulas o injertos

## 6 CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis

U.S. Department of  
Health and Human Services  
Centers for Disease  
Control and Prevention

[www.cdc.gov/ckd](http://www.cdc.gov/ckd) [www.cdc.gov/dialysis/patient](http://www.cdc.gov/dialysis/patient)



### CONSEJO 1

Cuide su acceso vascular en casa. Evite rayarlo o rasguñarlo.



### CONSEJO 2

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.



### CONSEJO 3

Lave o limpie su acceso vascular antes de su tratamiento.



### CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben seguir cuando utilizan su acceso vascular para el tratamiento.



### CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.



### CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con su acceso vascular.